

Cichorei per 1 maart 2017



J. (Hans) de Keijzer, Coördinator Effectief Middelenpakket Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Aardbeien

De informatie in dit overzicht is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks een uitvoerige controle kunnen wij geen enkele garantie geven over de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie. Lees voordat u een middel toepast altijd de informatie op het begeleidende etiket.

Dit overzicht is een momentopname; er vinden regelmatig wijzigingen plaats. Voor de laatste stand van zaken moet u opnieuw een verzoek indienen.

Herbiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Benfluralin	Bonalan	Eenjarige onkruiden	Voor inzaai	8 l/ha; 1x
Carbetamide	Legurame vloeibaar	Eenjarige onkruiden	Voor en na opkomst	7 l/ha i.c.m. 1,5 l/ha chloorprofam; 2x; 14d
Chloorprofam	Certis Chloor IPC, Intruder, Isopan, Chlorisyl, CIPC 400 EC	Eenjarige onkruiden	Voor opkomst of na opkomst bij kiemplantstadium (Certis); voor opkomst en na opkomst (Isopan, Chlorisyl, CIPC 400 EC); voor en na opkomst (Intruder)	Certis: 2 l/ha; 3x; 5d; of 0,5-1,0 l/ha; 12x; 5d; max. 4-6 l/ha; Intruder voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 8x; 5d; max. 4 l/ha; rest voor opk. 2 l/ha; 2x; 7d; na opk. 0,5-1 l/ha; 6x; 5d; max. 4 l/ha
Clethodim	Centurion Plus, Wopro-Clethodim 120 g/l	Eenjarige grasachtige onkruiden, kweek	Na opkomst	1 l/ha; 1x; tegen kweek 2,5 l/ha; 1x; vht 56d
Dimethenamide-P	Frontier Optima	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,3 l/ha; 3x; 7d of 0,45 l/ha; 2x; 7d of 0,9 l/ha; 1x
Ethofumesaat	Tramat 200 EC, Oblix 200 EC, Oblix 500 SC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,25-0,5 l/ha; 4x; 7d; max. 1 l/ha; Oblix 500 SC 0,1-0,2 l/ha; 4x; 7d; max. 0,4 l/ha
Fluazifop-P-butyl	Fusilade Max	Grasachtige onkruiden	Na opkomst	1-3 l/ha; 1x; vht 56d; niet tussen 30/9 en ¼
Pendimethalin	Stomp 400 SC, Stomp SC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,5 l/ha; 4x; 7d (op percelen grenzend aan oppervlaktewater max. 1x per seizoen)
Propaquizafop	Agil 100 EC (besluit CTGB 22-2-2017; nog niet gepubliceerd)			
Propyzamide	Kerb Flo, Kerb 50 W spuitpoeder, Setanta flo, Careca, Relva, CropGuard Propyzamide 400	Eenjarige onkruiden (Relva ook kweek)	Voor opkomst, na opkomst of na planten (Careca alleen voor opkomst; Relva voor of na opkomst)	3,75 l/ha; 1x; of 0,25-2,5 l/ha; 5x; 5d; max. 3,75 l/ha; Kerb 50 W 3 kg/ha; 1x; Careca 3 l/ha; 1x; vht 42d; Relva 2,8-3,1 l/ha; 1x
Rimsulfuron	Titus	Onkruiden in tolerante rassen	Na opkomst	30-40 g/ha; 2x; 10d; max. 70 g/ha

S-metolachloor	Dual Gold 960 EC	Eenjarige onkruiden	Na opkomst	0,1-0,3 l/ha; 6x; 5d; max. 1,3 l/ha
Triflusaluron-methyl	Safari	Breedbladige onkruiden	Na opkomst	30 g/ha; 4x; 7d
Diquat dibromide	Dragoon (besluit CTGB 22-2-2017; nog niet gepubliceerd), Mission 200 SL, Reglone Bold	Vogelmuur (Stellaria media)	Voor opkomst of voor uitplanten	1,5 l/ha; 1x
Glyfosaat	Veel middelen	Onkruiden	Pleksgewijs en/of aanstrijken	Zie etiketten
Insecticiden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval en vht
Bacillus thuringiensis sups. Aizawai	Turex Spuitpoeder, Xen Tari WG	Rupsen van gamma-uil (Autographa gamma/Plusia spp.)	Gewasbehandeling	1 kg/ha; 8x; 6d; Turex 1 kg/ha; 3x; 7d
Metam-natrium	Monam, Nemasol	Aaltjes	Grondontsmetting; 16 maart t/m 15 november	300 l/ha; 1x per 5 jaar; zie etiket voor beperkingen
Oxamyl	Vydate 10G, Wopro Oxamyl 10% G	Vrijlevende aaltjes	Rijenbehandeling tijdens zaaien	10 kg/ha
Thiacloprid	Calypso	Bladluizen (groene en rode perzikluis [Myzus persicae], aardappeltopluis [Macrosiphum euphorbiae], wegedoornluis [Aphis nasturtii], vuilboomluis [Aphis frangulae], zwarte bonenluis [Aphis fabae], sjalotteluis [Myzus ascalonicus], katoenluis [Aphis gossypii])	Gewasbehandeling	0,25 l/ha; 2x; 7d; vht 7d
Fungiciden	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Bacillus subtilis stam QST 713	Serenade SC	Sclerotinia sclerotiorum, meeldauw (Erysiphales), Alternaria spp.	Gewasbehandeling	8 l/ha; 6x; 5d
Boscalid+pyraclostrobin	Signum	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum)	Gewasbehandeling zodra aantasting wordt waargenomen	1,5 kg/ha; 2x; 14d; vht 14d
Coniothyrium minitans stam CON/M/91-8	Contans WG	Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia minor	Grondbehandeling voor zaaien of planten	4 kg/ha; 10 cm inwerken
Trifloxystrobin	Flint	Echte meeldauw (Erysiphe cichoracearum)	Gewasbehandeling zodra aantasting wordt waargenomen	0,25 kg/ha; 14d; max. 3x; max. 33% van toepassingen bij solo; max. 50% bij combinaties (geen strobilurinen)
Diversen	Middelen	Plaag	Tijdstip	Dosering, frequentie, interval, vht e.d.
Ijzer(III)fosfaat	Derrex, Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels, NEU 1181M, Sluux HP, Natria Slakkenkorrels, Iroxx, CropGuard Slakkenkorrel, Spuitmiddel Slakkenkorrel Plus	Naaktslakken	Een behandeling uitvoeren zodra slakken of slakkenvraat worden waargenomen.	7 kg/ha; Ferramol Ecostyle Slakkenkorrels en Natria Slakkenkorrels 25-50 kg/ha